

Observation des paramètres du processus		
<p>Activer les différents symboles par un clic au début de l'action correspondante. Activation du symbole = estampe chronologique (heure, date).</p> <p>➤ Si on manque le début exact d'une observation, on peut réinitialiser l'estampe chronologique au choix de 30 sec., 1, 2, 3 ou 4 minutes en appuyant longuement sur le symbole correspondant.</p> <p>Si aucune action (par ex. dépilation) n'a pu être observée, on ne doit pas activer les symboles ; ceux-ci restent alors en vert.</p>		
<div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Raccourcissement des poils sur le site opératoire</p> </div>		
<p>Activer ce symbole si une élimination (ou raccourcissement) des poils a été effectuée pendant l'observation. Seule une élimination des poils du site chirurgical principal importe. Une épilation sur d'autres régions du corps NE DOIT PAS être documentée.</p>		
Où a-t-on procédé à l'élimination/ raccourcissement des poils ?	Salle d'opération	
	BOP autres	
	BOP préparation opératoire	
	Unité	
Quand a-t-on procédé à l'élimination/raccourcissement des poils ?	Jour précédent ou avant	
	Le jour de l'opération	
Comment a-t-on procédé à l'élimination raccourcissement des poils ?	Crème dépilatoire	
	Rasoir jetable	
	Toneuse (clipper)	
Est-ce qu'un rasage additionnel a été effectué avec un rasoir à lame ?	Oui	Explication : Si un rasage mécanique (rasoir jetable) a été utilisé après la tondeuse ou une dépilation chimique, indiquez « oui ».
	Non	
Remarque	facultative	
<p>Le symbole apparaît en gris lorsque tous les champs de l'élimination des poils sont remplis. Activer par un clic le symbole suivant dans la liste à gauche.</p>		



Antibioprophylaxie

Veillez indiquer si et, dans l'affirmative, combien d'antibiotiques ont été administrés **pendant la période d'observation**.

Démarrer l'administration d'antibiotique à l'aide de l'horodateur; Cliquer sur chaque antibiotique (si plusieurs produits) au début de l'administration et saisir/enregistrer les données.

Antibiotique	<p>Sélectionner l'antibiotique correspondant dans la liste prédéfinie (nom du principe actif/marque). Si les antibiotiques appliqués ne sont pas sur la liste de sélection, vous pouvez utiliser la fonction de recherche « Autres antibiotiques ».</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Il s'agit uniquement de la dernière dose d'antibiotique avant l'incision administrée par voie intraveineuse pendant la période d'observation.➤ Sans différencier s'il s'agit d'une thérapie ou d'une prophylaxie.➤ Lors de l'administration de plusieurs substances, l'application CCM pondère automatiquement quel antibiotique est "antibiotique 1". <p>Feedback : le choix de la substance active de l'antibiotique n'est pas évalué et n'est donc pas indiqué dans le feedback.</p> <p>Veillez également consulter le manuel de surveillance SSI. (www.swissnoso.ch/fr/modules/ssi-intervention/materiel/manuel/)</p>
Dose administrée (en mg)	<p>Noter la dose administrée en milligrammes (mg).</p> <p>Exemple : administration de 2g de Kefzol (Cefazoline=30) : noter 2000 mg</p>
Remarque	facultative

Le symbole **Antibioprophylaxie reste vert lorsque** tous les champs de l'antibiothérapie sont remplis, le symbole pouvant être activé plusieurs fois.
Activer par un clic le symbole suivant dans la liste à gauche.



Désinfection préopératoire de la zone à opérer (antisepsie)

Le **site opératoire principal** correspond à celui de l'intervention principale ou à l'emplacement de l'incision principale.

En cas d'intervention nécessitant la désinfection de plusieurs zones, référez-vous à la définition du site opératoire principal et secondaire.

- Lorsque l'on utilise le propre matériau de greffe, l'emplacement de l'implantation est considéré comme le site chirurgical principal, le site de prélèvement comme site chirurgical secondaire (exemple : site de prélèvement veineux dans le cas du pontage coronarien).
- Dans le cas d'opérations abdominales avec désinfection simultanée des muqueuses, le site d'incision principal est considéré comme le site chirurgical principal, par ailleurs les régions désinfectées ne sont pas considérées comme des sites chirurgicaux secondaires et ne sont donc pas enregistrées comme sites de désinfection secondaires.

La **désinfection secondaire** n'est enregistrée que sur le **site chirurgical secondaire**, par exemple le site d'ablation de veines en chirurgie cardiaque.

Désinfection du site opératoire principal (si disponible: Position additionnelle de chirurgie secondaire)

Type de peau	Muqueuse
	Peau
	Plaie
Choix du désinfectant	Solution alcoolique
	Solution aqueuse
Rémanence (site opératoire principal)	Aucune
	CHX 2%
	Octénidine
	PVP
Nombre d'applications	Sélection 1, 2, 3, >3 L'application du désinfectant sur le site opératoire principal doit s'effectuer par couches séparées, clairement visibles, selon la définition précédemment donnée.
Remarque	facultative

La durée du temps d'application en secondes (début de la couverture du site opératoire principal) est définie comme la durée totale du temps d'application de tous les recouvrements, du début de la désinfection cutanée au début de la couverture.

Si le désinfectant cutané est retiré au bord du champ opératoire à l'aide d'une languette stérile afin de mieux faire adhérer le champ opératoire, le début de cette action doit être défini comme la fin du temps d'exposition (= activation du début du couverture du site opératoire).



Début de la pose du champ site opératoire principal (= fin du temps de l'action de désinfection de la peau).

La même procédure s'applique pour le site opératoire secondaire (PCAV avec greffon prélevé à une extrémité), en activant le symbole Début pose du champ site opératoire secondaire.



Incision

Par horodatage; pour enregistrer le début de l'intervention chirurgicale (site chirurgical principal uniquement).



Remarque

Possibilité de reporter ici des commentaires pour des variables observées hors module (p. ex. champage, time-out, désinfection hygiénique des mains, etc.)

En cliquant sur le symbole ➤ en page 2/3, l'observation est considérée comme achevée après confirmation par l'utilisateur. Dès lors, elle ne pourra plus être modifiée.

Si un ou plusieurs événements n'ont pas été observés (= symbole non activé), il faut le confirmer à la fin de l'observation.

Si le message d'erreur « Les événements ne sont pas entièrement remplis » apparaît, vérifier les conditions suivantes :

- Est-ce que les données du patient sont complètes ?
- Est-ce que les données de l'observation sont complètes ? Si non, le symbole ⚠ sera visible et les données manquantes doivent être complétées.
- Est-ce qu'un événement a été activé par erreur (et donc aucune donnée correspondante saisie)? ; si oui effacer l'événement. 🗑

Feedback

Le résumé de la procédure de saisie, y compris les remarques et la liste des processus incorrects, peut être ouvert ou fermé en cliquant sur la partie correspondante.

Correct 🗨️ marqué en vert, incorrect 🗨️ marqué orange

Le symbole ➤ permet d'ouvrir, de fermer ou de consulter à nouveau les différentes entrées.

Explications complémentaires

Sous le menu navigation à droite  , vous pouvez:	
– Ouvrir des nouvelles observations dans le service présélectionné. 	
En cas de changement de service, veuillez entrer ces données sous les options à gauche 	
– Sélectionner des observations ouvertes , les compléter ou les effacer (cliquer sur ).	
– Consulter des observations terminées ; les 5 dernières observations terminées de Cleanhands et de SSI sont listées chronologiquement. Seules les observations Cleanhands peuvent être modifiées. Une fois achevées, les observations ne peuvent plus être effacées.	
Vous pouvez sélectionner ces options en cliquant sur le symbole à gauche : 	
– Changer l'hôpital 	
– Changer le service 	
– Changer le module 	
– Se déconnecter 	
– Faire parvenir un feedback au support de CCM-SSI 	
– Ouvrir les instructions CCM-SSI („ Aide SSI “) 	
– Ouvrir les instructions CleanHands („ Aide Clean Hands “) 	
– Voir les symboles de CleanHands 	