

BLASEN- KATHETER



INDIKATIONEN

Harnverhalt

- akuter Harnverhalt
- symptomatische chronische Ausflusso bstruktion
PLUS > 300 ml Restharn

Urinmonitoring/ Bilanzierung

- in regelmässigen kurzen Intervallen **PLUS** direkte
therapeutische Konsequenzen aus der Bilanzierung

Operation

- Operationsdauer > 4 h
- perioperativ: aus operationstechnischen Gründen
- Urogenitalchirurgie und/oder Beckenbodenchirurgie
- epidurale/peridurale Anästhesie/Analgesie

Dekubitalulzera **PLUS** Inkontinenz

- Dekubitus Grad III oder IV oder Hauttransplantate
sacral/perineal **PLUS** Inkontinenz*

Prolongierte Immobilisation

- aus medizinischen Gründen*, insbesondere zur
Schmerzreduktion

Palliation **PLUS** Komfort

- terminal-palliative Situation **PLUS** Störung der
Blasenfunktion **PLUS/ODER** Schwierigkeit einer
normalen Miktion*
- bei hohem Leidensdruck **PLUS** auf Wunsch des
informierten Patienten

* Nach Ausschöpfung von Alternativmethoden zur kontrollierten Urinableitung

KATHETER NICHT BEI ...

- asymptomatische chronische Harnretention
- Urinmonitoring od. Bilanzierung, wenn Gewichtskontrolle möglich
- Intensivpflege-Bedürftigkeit
- Inkontinenz
- Immobilisation, solange Alternativmethoden möglich
- reine Komfortlösung ausser bei Palliation



Seltener




Kürzer



Sicherer

FLOWCHART



patientensicherheit schweiz

SWISSNOSC

www.patientensicherheit.ch | www.swissnoso.ch

Referenz: Schriftenreihe mit Update Nr. 9, Patientensicherheit Schweiz

ISBN 3-905803-21-6